



1. Barcud coch

Aeth yn brin ar un cyfnod gydag ond ychydig barau yng Nghymru (yn ardal Pumlumon, Sir Aberteifi) oherwydd yr hela trwm ac i wenwyn fynd i'r gadwyn fwyd. Mae'n cynyddu

bellach. Yn frowngoch gyda phen gwelw a darn gwyn o dan yr adain. Yr adenydd yn hir a chul a'r gynffon yn fforchog. Ei hoff fwyd yw mamaliaid bach, cwingod, defaid marw, cywion brain a gwyfanod.



2. Bwncath

Mae tua 51–57 cm o hyd a rhwng 110 a 130 cm ar draws yr adenydd. Fel rheol yn nythu mewn coeden, ond yn hela dros dir agored. Oherwydd hyn, mae'n hoffi tiriogaeth lle mae cymysgedd o goed a chaeau. Mae'n bwyta

mamaliaid bach yn bennaf, yn cynnwys llygod, llygod mawr a chwingod, ond mae hefyd yn bwyta anifeiliaid wedi marw, cywion adar a phryfed genwair. Gellir gweld pâr, neu ddau bâr o fwncathod yn troelli yn yr awyr uwchben eu tiriogaeth yn y ganwyn, ac yn tynnu sylw trwy eu galwadau *pii-âw*, nid annhebyg i gathod.




3. Cudyll coch

Aderyn gweddol fychan, rhwng 34 a 38 cm o hyd a 70–80 cm ar draws yr adenydd. Y rhan fwyaf o'r plu yn frown gyda smotiau du, ac mae gan y ceiliog ben a chynffon llwydilas.

Wrth hedfan, gellir ei adnabod o'r gynffon hir, adenydd hir a'r ffaith ei fod yn aml yn medru aros yn ei unfan yn yr awyr wrth hela. Anifeiliaid bychan, yn enwedig gwahanol fathau o lygod, yw'r prif fwyd, ond mae hefyd yn bwyta adar bychain, llyffantod a phryfed. Wrth hela yn aml bydd yn aros yn ei unfan yn yr awyr i wyllo am symudiad cyn plymio i'r ddaear. Yn nythu mewn coed, yn aml yn defnyddio hen nythod brain, ar greigiau, neu ar ben adeiladau.


4. Gwalch glas

Mae'n nythu mewn coed, ac yn hela adar bychain yn bennaf. Gall symud yn gyflym trwy'r coed i ddal adar cyn iddynt wybod ei fod yno. Ei gynffon yn hir ac adenydd gweddol fyr a llydan. Mae'r ceiliog yn llwydilas ar ei gefn a llinellau coch ar y fron, tra mae'r îar yn fwy brown. Y ceiliog sydd rhwng 29 a 34 cm o hyd a 59–64 cm ar draws yr adenydd ac yn llai na'r îar. Mae'n aderyn cyffredin yma sy'n cynyddu erbyn hyn ac i'w weld ymhobman heblaw yn y mynyddoedd.



5. Gwalch y pysgod

Mae'n byw yn bennaf ar bysgod. Mae ganddo ddsbarthiad eang iawn trwy'r byd, ac yn un o'r ychydig adar sydd i'w cael ar bob cyfandir heblaw yr



Antarctig. Mae'n 60 cm mewn hyd a 180 cm o adain i adain. Brown ydy rhan uchaf ei gorff a'r rhan isaf yn wyn; mae ymylon ei lygaid a'i esgyll yn blu du. Gall blymio i'r dŵr ar gyflymder uchel i ddal ei ysglyfaeth gyda'i grafangau. Mae'n nythu gerllaw llynnoedd ac afonydd fel rheol. Diflannodd o wledydd Prydain yn 1916 ond dychwelodd y gwalch i nythu yn y 1950au.

6. Hebog Tramor

Mae'n aderyn cyffredin yng Nghymru, fel rheol yn nythu yn y mynyddoedd, ond gall hefyd nythu ar adeiladau uchel. Bydd yn treulio'r gaeaf o gwmpas glannau'r môr. Mae'r îar yn fwy na'r ceiliog fel rheol. Yn aml clywir yr alwad "kek-kek-kek-kek" pan fo rhywun yn dynesu at y nyth. Ei fwyd yw adar maint colomen (colomennod dof, ysguthanod, grugieir, adar môr). Bydd yn plymio arnynt oddi uchod yn ddiarwybod iddynt ac ystyrir yn un o'r adar sy'n medru hedfan gyflymaf. Dywedir y gall gyrraedd 200 milltir yr awr pan fo'n disgyn o uchder i geisio dal aderyn.



Pryd?

Ble?

Pwynt

1 _____

30

2 _____

15

3 _____

30

Pryd?

Ble?

Pwynt

4 _____

20

5 _____

40

6 _____

35